

# Информация за пациента

## Показания за предписване на Диане 35®:

Диане 35® се използва за лечение на кожни състояния като акне, много мазна кожа и прекомерно окосмяване при жени в репродуктивна възраст. Поради контрацептивните си свойства, той трябва да Ви се предписва, само ако Вашият лекар прецени, че лечението с хормонално контрацептивно средство е подходящо за Вас.

Трябва да приемате Диане 35®, само ако състоянието на кожата Ви не се е подобрило след други терапии срещу акне, включително локално лечение и антибиотици.

## Важна информация за Диане 35® и

### риска от образуване на кръвни съсиреци

Всички комбинирани естроген-прогестаген продукти, като Диане 35®, увеличават редкия, но важен риск от образуване на кръвен съсирек. Като цяло, рискът за формиране на кръвен съсирек е малък, но последиците от образуване на съсиреци могат да бъдат сериозни и, в много редки случаи, могат да бъдат дори фатални.

Много е важно да разберете кога имате повишен риск от образуване на кръвен съсирек, за какви признаци и симптоми трябва да внимавате и какви действия трябва да предприемете.

### Кога рискът от образуване на кръвен съсирек се повишава?

- през първата година от употребата на Диане 35® (включително ако подновявате употребата след прекъсване от 1 месец или повече)
- ако имате изразено наднормено тегло (индекс на телесна маса над 30 kg/m<sup>2</sup>)
- ако възрастта Ви е над 35 години
- ако имате близък член на семейството, който е имал кръвен съсирек в относително ранна възраст (напр. под 50 години)
- ако сте родили през предходните няколко седмици
- ако пушите и сте на възраст над 35 години, настоящият съвет за Вас е да спрете да пушите или да използвате нехормонално лечение за Вашето акне и/или хирзутизъм.

### Незабавно потърсете лекарска помощ, ако получите някой от следните симптоми:

- Силна болка или подуване в крака, които могат да се съпровождат от чувствителност, топлина или промени в цвета на кожата, например побледняване, почервяване или посиняване. Възможно е да имате **дълбока венозна тромбоза**.
- Внезапен, необясним недостиг на въздух или учестено дишане; силна болка в гръдния кош, която може да се увеличи при дълбоко вдишване; внезапна кашлица без видима причина (при която може да се откашля кръв); може да развие сериозно усложнение на дълбоката венозна тромбоза, наречено **белодробен емболизъм**. Това се случва, ако кръвният съсирек се придвижи от крака към белия дроб.
- Болка в гръдния кош, често остра, но понякога само дискомфорт; притискане, тежест, усещане за дискомфорт в горната част на тялото, разпространяващо се към гърба, челюстта, гърлото, ръката, придружено от усещане за тежест в стомаха; нарушено храносмилане или задавяне; изпотяване, гадене, повръщане или замаяване. Може да получавате **сърдечен удар**.
- Усещане за слабост или изтръпване на лицето, ръката или крака, особено в едната половина на тялото; затруднен говор или разбиране; внезапно объркване; внезапна загуба на зрение или замъглено зрение; силно главоболие/мигрена, по-тежки от обикновено. Може да получавате **мозъчен удар**.

### Следете за симптоми на кръвен съсирек, особено ако:

- наскоро сте претърпели операция
- сте били обездвижени за дълго време (напр. поради нараняване или заболяване, или ако кракът Ви е в гипс)
- сте имали дълго пътуване (напр. дълъг полет)

### Не забравяйте да уведомите Вашия лекар, медицинска сестра или хирург, че приемате Диане 35®, ако:

- имате планирана или Ви е направена операция
- медицински специалист Ви попита, дали взимате някакво лекарство

За повече информация, моля, прочетете съпътстващата Листовка за пациента или посетете: [www.bda.bg](http://www.bda.bg).

### Призив за съобщаване на нежелани лекарствени реакции

Бихме искали да напомним, че пациентите могат да съобщават нежелани лекарствени реакции по всяко време на медицинските специалисти или на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ).

ул. Дамян Груев № 8  
1303, гр. София  
Р. България  
тел.: +359 2 8903 417  
факс: +359 2 8903 434  
е-mail: [bda@bda.bg](mailto:bda@bda.bg)



[www.bda.bg](http://www.bda.bg)/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица

или

**Притежател на разрешението за употреба**

Bayer Pharma AG  
D-13353 Berlin  
Германия

**Контакти на компанията за допълнителна информация**

**Байер България ЕООД**

ул. Резбарска 5  
1510, гр. София  
тел.: + 359 2 81401 01  
факс: + 359 2 81401 70  
е-mail: [drugsafety.bulgaria@bayer.com](mailto:drugsafety.bulgaria@bayer.com)

Като съобщавате нежелани лекарствени реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.